Nursing unity

Le vitiligo

Définition

- La plus fréquente des hypo mélanoses
- Pathogénie inconnue
- Disparition progressive des mélanocytes de l'épiderme, des follicules pileux et des muqueuses
- Motif de consultation frq, 1pr 100 de la population
- Conséquences psychosociales difficiles prb thérapeutiques

Epidémiologie

- Dermatose acquise, mais dans un tiers des cas : ATCD familiaux, il est donc déterminé génétiquement
- Les deux sexes st atteints
- Peut apparaitre à tt âge, surtt 3° décennie
- Déclenchement à la suite de traumatisme psych-affectifs
- Soleil accentue mais pas facteur déclenchant

Diagnostic positif

- Est clinique
- La lésion élémentaire est une macule achromique d'un blanc uniforme, elle totalement dépourvue de mélanine
- Sa surface est normale, sans atrophie ni hyperkératose
- Limites avec peau avoisinante st nettes
- Taches de forme et de taille variables, bords tjrs convexes

- Ubiquitaire, mais prédilection des organes génitaux ext, plis axillaires, régions périorificielles et les zones de protubérance osseuses
- Cuir chevelu : mèche blanche
- Extension variable
- Evolution imprévisible
- Aucun examen élémentaire
- Prf associé à d’autres mdies extra-dermatologiques

Traitement

- Il n’existe actuellement aucun ttt de fond capable de modifier l’évolution du vitiligo
- PEC psychologique
- Ttt repigmentant :
- -ttt médical ; photochimiothérapie par voie orale ou locale
- -ttt chirurgical : minigreffes de peau saine permettent d’obtenir une repigmentation centrifuge à partir de l’implantation
- Camouflage des lésions : produits cosmétiques peuvent être proposés